

Substance Abuse Treatment Scale (SATS)

Drake, R.E., Mueser, K.T. & McHugo, G.J.
(Version française: Division
psychosociale, Centre de Recherche de
l'hôpital Douglas)

Numéro de dossier:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Date de l'évaluation

		/			/				
mois			jour			année			

Intervenant:

--

Cette échelle est conçue pour évaluer à quelle étape se trouve une personne dans sa démarche de traitement pour abus d'alcool et/ou de drogues, et non pas pour poser un diagnostic. L'évaluation porte sur les 6 DERNIERS MOIS. Si la personne est institutionnalisée, l'évaluation porte sur la période avant l'admission. NOIRCIR LE CERCLE APPROPRIÉ. EN CHOISIR UN SEULEMENT

Alcool Drogues

- ☐ ☐ **Ne s'applique pas.** Le client n'a jamais eu de problèmes d'alcool ou de drogues
- ☐ ☐ **Pré-engagement.** Le client n'a aucun contact avec un agent de suivi ou intervenant, en santé mentale ou en toxicomanie.
- ☐ ☐ **Engagement.** Le client a eu des contacts avec un agent de suivi ou un intervenant, mais ne le rencontre pas régulièrement. Le manque de contacts réguliers laisse supposer un manque d'alliance thérapeutique.
- ☐ ☐ **Début de la persuasion.** Le client a des contacts réguliers avec un agent de suivi ou un intervenant, mais il n'a pas diminué sa consommation d'alcool/de drogues pendant plus d'un mois. Des contacts réguliers laissent supposer une alliance thérapeutique et une relation qui permettent la discussion sur l'abus d'alcool/drogues.
- ☐ ☐ **Persuasion avancée.** Le client est engagé dans une relation avec un agent de suivi ou un intervenant, discute de son abus d'alcool ou de drogues ou fait partie d'un groupe, et démontre une réduction dans la consommation d'une durée d'au moins un mois (moins de types de drogues, quantités réduites, ou les deux). Des contrôles externes (par ex.:Antabuse) peuvent être impliqués dans la réduction.
- ☐ ☐ **Début du traitement actif.** Le client est en traitement, discute de l'usage de substance ou fait partie d'un groupe, a diminué sa consommation depuis au moins un mois et vise l'abstinence (ou une consommation contrôlée sans problèmes associés), même s'il continue peut-être d'abuser d'alcool/drogues.
- ☐ ☐ **Traitement actif avancé.** Le client est en traitement, a reconnu qu'il avait un problème d'abus d'alcool/drogues et est parvenu à l'abstinence (ou à l'usage contrôlé sans problèmes associés) depuis au moins six mois.
- ☐ ☐ **Prévention de la rechute.** Le client est en traitement, a reconnu qu'il avait un problème d'abus d'alcool/drogues, est parvenu à l'abstinence (ou à un usage contrôlé sans problèmes associés) depuis au moins six mois. Des manquements occasionnels sont permis s'ils n'évoluent pas au-delà de quelques jours.
- ☐ ☐ **En rémission ou en rétablissement.** Le client n'a eu aucun problème relié à la consommation de substances depuis plus d'un an et ne suit plus aucun type de traitement pour alcoolisme/toxicomanies.

Temps de dépistage:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ☐ 0 mois | ☐ 15 mois |
| ☐ 3 mois | ☐ 18 mois |
| ☐ 6 mois | ☐ 21 mois |
| ☐ 9 mois | ☐ 24 mois |
| ☐ 12 mois | |